

新型コロナウイルスワクチン予防接種についての説明書

ファイザー社
ワクチン用
(2021年6月)

新型コロナウイルスワクチン接種について

本ワクチンの接種は国と地方自治体による新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン接種事業の一環として行われます。本ワクチンの接種は公費対象となり、希望者は無料で接種可能です。なお、本ワクチンは12歳以上の方が対象です。

ワクチンの効果と投与方法

今回接種するワクチンはファイザー社製のワクチンです。新型コロナウイルス感染症の発症を予防します。

本ワクチンの接種を受けた人は、受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています。（発症予防効果は約95%と報告されています。）

販売名	コミナティ [®] 筋注
効能・効果	SARS-CoV-2による感染症の予防
接種回数・間隔	2回（通常、3週間の間隔） ※筋肉内に接種
接種対象	12歳以上（12歳未満の人に対する有効性・安全性はまだ明らかになっていません。）
接種量	1回0.3 mLを合計2回

- 1回目の接種後、通常、3週間の間隔で2回目の接種を受けてください。（接種後3週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目の接種を受けてください。）
- 1回目に本ワクチンを接種した場合は、2回目も必ず本ワクチン接種を受けてください。
- 本ワクチンの接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日程度経って以降とされています。現時点では感染予防効果は十分には明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります。

予防接種を受けることができない人

下記にあてはまる方は本ワクチンを接種できません。該当すると思われる場合、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 明らかに発熱している人（※1）
- 重い急性疾患にかかっている人
- 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症（※2）の既往歴のある人
- 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人

（※1）明らかな発熱とは通常 37.5℃以上を指します。ただし、37.5℃を下回る場合も平時の体温を鑑みて発熱と判断される場合はこの限りではありません。

（※2）アナフィラキシーや、全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。

予防接種を受けるに当たり注意が必要な人

下記にあてはまる方は本ワクチンの接種について、注意が必要です。該当すると思われる場合は、必ず接種前の診察時に医師へ伝えてください。

- 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある人
- 過去に予防接種を受けて、接種後2日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状がでた人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人

（うらへ続く）

妊娠中、又は妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に、薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことがある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。

接種を受けた後の注意点

- 本ワクチンの接種を受けた後、15 分以上（過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことがある方や、気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことがある方は 30 分以上）、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。（急に起こる副反応に対応できます。）
- 注射した部分は清潔に保つようにし、接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにしてください。
- 通常の生活は問題ありませんが、当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。

副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談しましょう。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症について

SARS-CoV-2 による感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン（ファイザー社製のワクチン）の特徴

本剤はメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンであり、SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質（ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質）の設計図となる mRNA を脂質の膜に包んだ製剤です。本剤接種により mRNA がヒトの細胞内に取り込まれると、この mRNA を基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2 による感染症の予防ができると考えられています。

本剤には、下記の成分が含まれています。

有効成分	◇ トジナメラン（ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードする mRNA）
添加物	◇ A L C - 0 3 1 5 : [(4 - ヒドロキシブチル) アザンジル] ビス (ヘキサン - 6 , 1 - ジイル) ビス (2 - ヘキシルデカン酸エステル)
	◇ A L C - 0 1 5 9 : 2 - [(ポリエチレングリコール) - 2000] - N , N - ジテトラデシルアセトアミド
	◇ D S P C : 1 , 2 - ジステアロイル - sn - グリセロ - 3 - ホスホコリン
	◇ コレステロール
	◇ 塩化カリウム
	◇ リン酸二水素カリウム
	◇ 塩化ナトリウム
	◇ リン酸水素ナトリウム二水和物
	◇ 精製白糖

新型コロナワクチンの詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン

検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

参考資料

◎予診票内(基礎疾患を有する)とは

1. 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方

1. 慢性の呼吸器の病気
2. 慢性の心臓病(高血圧を含む)
3. 慢性の腎臓病
4. 慢性の肝臓病(肝硬変等)
5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6. 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
7. 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む)
8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
11. 染色体異常
12. 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
13. 睡眠時無呼吸症候群
14. 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

2. 基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方

※ $BMI = \text{体重(kg)} \div \text{身長(m)} \div \text{身長(m)}$

※ BMI 30の目安:身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

(うらへ続く)

血をサラサラにする薬を飲まれている方へ

飲んでいるお薬によっては、出血すると止まりにくいことがあるので、
予診票でお薬の種類をおたずねしています。

ワクチンを受けることはできますが、接種後の出血に注意が必要です。

接種（筋肉注射）にあたっての注意点



接種後は、2分間以上、しっかり押さえてください。

- ・腕が腫れる・しびれるなどの症状が出たら、医師にご相談ください。
- ・接種にあたって、お薬の休薬は必要ありません。

対象の
お薬

抗凝固薬

不整脈、血栓症、心臓の手術後の方にも処方されることが多いお薬です。

商品名	一般名
ワーファリン	ワルファリンカリウム
プラザキサ	ダビガトランエテキシラート
イグザレルト	リバーロキサバン
エリキュース	アピキサバン
リクシアナ	エドキサバントシル酸塩水和物

血をサラサラにする薬には、次のような薬もありますが、
通常どおり接種を受けていただけます。

抗血小板薬など

バイアスピリン	アスピリン	コンプラビン配合錠	アスピリン・クロピドグレル硫酸塩
パナルジン	チクロピジン塩酸塩		
プラビックス	クロピドグレル硫酸塩	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール
エフィエント	プラスグレル塩酸塩		
フレタール	シロスタゾール	エパテール	イコサペント酸エチル(EPA)
バファリン	アスピリン・ダイアルミネート配合剤	ドルナー、プロサイリン	ベラプロストナトリウム
ブリリタ	チカグレロル	アンプラーグ	サルボグレレート塩酸塩

新型コロナウイルスワクチン接種を受診される方へ（ご案内）

※ワクチン接種は、いくつかの方法から選ぶことができます。

～時津町集団接種を希望される方へ～

7月末に「新型コロナウイルスワクチン接種アンケート」をお送りいたします。
 接種開始時期は、9月上旬を予定しております。ご不明な点がございましたら、時津町コールセンターへご連絡ください。
 ワクチンは、「ファイザー社」のワクチンを使用します。1回目の接種から3週間後に、2回目の接種をします

時津町コールセンター	TEL：095-865-6868 (受付時間：9時～17時※土日祝除く)
------------	---

～個別（町内医療機関）で接種を希望される方へ～

希望される場合は、予約が必要となります。詳細は、下記をご覧ください。対象者は、接種券をお持ちの方です。

個別接種実施（町内医療機関）一覧：令和3年6月18日時点

	地区名	医療機関名称	住所	電話番号	備考
1	西時津郷	高木クリニック	西時津郷75番地20	881-3230	・予約方法は電話（診療時間内）か来院 ・接種日時は病院が指定
2	浜田郷	鎌先医院	浜田郷520番地5	882-2622	・予約は病院ホームページのお問い合わせ欄より （上記不可の場合のみ電話で予約） ・接種日：月曜日・水曜日 ・接種時間：15～17時のみ
3	元村郷	長崎百合野病院	元村郷1155番地2	857-3366	・予約方法：予約専用ダイヤル ①080-8580-7491 ②080-8580-7492 ・接種日時：火曜日14～16時、土曜日10～12時
4	野田	三浦産婦人科	野田郷25番地1	882-7000	・要予約 ・女性のみ受付 ・接種日：月曜日・水曜日 ・接種時間：午後のみ
5	浦郷	黒崎医院	浦郷275番地4	882-2125	・要予約（電話か来院） ・予約受付：10時～12時、14時～16時 ・接種日（原則）：火曜日・金曜日 ・接種時間：14～17時
6		安永脳神経外科	浦郷264番地3	813-2001	・予約電話受付日：月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 ・予約電話受付時間：14～17時30分 ・かかりつけ、時津町在住を優先します。
7	日並	近藤医院	日並郷1325番地8	882-7060	・電話での予約が必要

※表に記載のない医療機関でもワクチン接種が可能な場合があります。（通院患者のみ対応など）

※使用するワクチン等、詳しくは、直接医療機関へお尋ねください。

～長崎県新型コロナワクチン接種センターで接種を希望される方へ～

※ワクチンは、「武田/モデルナ社」のワクチンを使用します。1回目の接種から4週間後に、2回目の接種をします。

予約方法	①Web（インターネット）※推奨
	②長崎県新型コロナワクチン接種コールセンター
	TEL：0570-065-478（受付時間9時～17時、土日も対応）
	③はがき

※詳しくは、長崎県新型コロナワクチン接種コールセンターまたは、県ホームページをご確認ください。

～職場や大学などで接種を希望される方へ～

職場や大学などでのコロナワクチンの職域接種について、県内でも実施に向けた動きが進んでいます。ご希望される場合は、各窓口へご連絡ください。

※ワクチンは、「武田/モデルナ社」のワクチンを使用します。1回目の接種から4週間後に、2回目の接種をします。